

Player® 250 SC

- › Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione
- › Attivo verso oidio, fusariosi ed altre malattie dei cereali
- › Formulazione liquida ad elevata concentrazione

COMPOSIZIONE

tebuconazolo* 24,4% (250 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata (SC)

CODICE FRAC

3

REG. MIN. SALUTE

n° 13252 del 25.03.2011

BUFFER ZONE

Non previste

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H317; H361d; H410; EUH401



Attenzione



SETTORI DI IMPIEGO

Cultura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Frumento, Segale	Oidio, Ruggini, Septoria	1 l/ha	- 1-2 trattamenti tra accestimento e spigatura alla comparsa dei primi sintomi per il controllo di Oidio, Ruggini e Septoria	35 gg	2
Orzo, Avena	Fusariosi della spiga Mal del piede (azione collaterale)		- Intervenire in piena fioritura per il controllo della Fusariosi della spiga	Interrompere le applicazioni a fine fioritura	1
Vite da vino	Oidio	40 ml/hl (0,4 l/ha)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi intervenendo ogni 10-14 gg in miscela o alternanza a prodotti con differente meccanismo d'azione	30 gg	3
Frutta a guscio	Antracnosi, Necrosi apicale bruna	60 ml/hl (0,6 l/ha)	Trattamenti a distanza di 14 gg a partire dalla fioritura	n.r.	2
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> , <i>Sclerotinia homeocarpa</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>	1,5-2 l/ha	Intervenire alla prima comparsa dei sintomi. Ripetere se necessario dopo 10-20 gg. Utilizzare un volume d'acqua di 600-800 l/ha	n.r.	2

*s.a. originale Nufarm
Prodotto originale Diachem



FLACONE

1 l (cartone 10 pz)

TANICA

5 l (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Si sconsiglia la miscela con prodotti contenenti fosetil alluminio.